

인플루엔자 바이러스 치료제

안전사용 길라잡이



인플루엔자 바이러스 치료제에는 어떤 약들이 있나요?



먹는약으로
오셀타미비르 성분 제제가 있습니다.

치료 및 예방*

생후 2주 이상 신생아(수태 후 36주 미만 제외),
소아, 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료,
1세 이상의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 예방



흡입하는 약으로
자나미비르 성분 제제가 있습니다.

치료 및 예방*

7세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료 및 예방

* 예방의 일차요법은 백신요법이므로 독감 치료제는 백신 대신 사용할 수 없습니다.



주사제로
페라미비르 성분 제제가 있습니다.

치료

2세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료

소아, 청소년의 경우 주의해야 할 사항이 있나요?

소아·청소년 환자에게서 **경련**과 **섬망**(심한 과다 행동과 생생한 환각, 초조함, 떨림 등이 자주 나타나는 상태)과 같은 **신경정신계 이상반응**이 나타날 수 있으며, **추락** 등 사고에 이르는 사례가 보고되었습니다.

※ 그러나 이 약 투여로 인한 것인지는 알려져 있지 않고 이 약을 투여하지 않았던 환자에서도 유사한 증상이 나타날 수 있습니다.



환자와 함께 있어 주세요!

따라서, 보호자는 치료제 투여와 관계없이

- ① 인플루엔자 환자를 적어도 **2일간** 혼자 있지 않도록 **함께 하고**
- ② 창문과 베란다, 현관문 등을 **꼭 잠그며**
- ③ **이상행동**이 나타나는지 면밀히 관찰해야 합니다.



의약품 부작용이 발생하면?

의약품을 복용한 후 부작용이 의심되면
의사 또는 약사와 상담한 후
한국의약품안전관리원으로 보고해주세요.
국민 여러분의 보고자료는
부작용 예방대책을 마련하는 밑거름이 됩니다.



의약품 부작용

보고 및 피해구제 무료상담

1644-6223



국민이 안심할 수 있는 의약품 안전정보!



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원